

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。



便秘のための坐薬です

コラック坐薬 タイプ

第3類医薬品

〈便秘薬〉

- ◆コラック坐薬タイプは、微細な球の状態で発生した炭酸ガスが、直腸に直接はたらき、おだやかな便通をうながします。
- ◆肛門から挿入後、おおよそ10~30分で効果があらわれます。

本剤は肛門から挿入する便秘のためのお薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

① 次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

② 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も服用又は使用しないでください

他の便秘薬(下剤、浣腸薬)

③ 連用しないでください

(常用すると、効果が減弱し(いわゆる“なれ”が生じ)薬にたよりがちになります)



相談すること

① 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 今までに薬によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ等)を起こしたことがある人。

(3) 次の症状のある人。

はげしい腹痛、恶心、嘔吐

② 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
消化器	下痢、残便感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック	使用後すぐに胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

(2) 2~3回使用しても排便がない場合。

その他の注意

次の症状があらわれることがあります

肛門部の刺激感、腹痛、腹部不快感

成 分

1個(2.6g)中

成 分

分 量

はたらき

炭酸水素ナトリウム

0.5g

微細球状態の炭酸ガスを発生し、腸の運動を促進します。

無水リン酸二水素ナトリウム

0.68g

炭酸ガスの発生を助けます。

添加物：無水ケイ酸、大豆レシチン、ハードファット

効 能

便 秘

用法・用量

12才以上、1回1個を直腸内に挿入し、それで効果のみられない場合には、さらにもう1個を挿入してください。
12才未満は使用しないでください。

12才以上
1回1個

本剤は肛門から挿入するお薬です。口から服用しないでください。


[注意]

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)12才以上の小児に使用せる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)本剤は肛門からのみ挿入し、内服しないでください。
- (4)本剤使用後は、便意が強まるまでしばらくがまんしてください。
(使用後、すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがあります)
- (5)本剤が軟らかい場合には、しばらく冷やした後に使用してください。
また、硬すぎる場合には、直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので、しばらく室温に放置し、軟らかくなった後に使用してください。




坐薬のとり出し方・挿入の仕方

1個をミシン目から
切りはなします。




合わせ目を左右に引きはがして
坐薬をとり出します。



肛門から坐薬を挿入します。
すわった状態で坐薬を入れ、
手でおさえて肛門に力を入れ
ながら立ち上がると、簡単に
挿入することができます。

*手でおさえ、ゆっくり
立ち上がる



保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない30℃以下の涼しい所に保管してください。ただし、アルミ袋を開封後の未使用分は、直射日光の当たらない湿気の少ない冷所(15℃以下)に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)保管する場合は、図のように坐薬の先を下に向けてアルミ袋に戻し、外箱に入れ、マークに従って立てて保管してください。
- (4)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (5)使用期限(アルミ袋・外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても、開封後はなるべくはやく使用してください。
(品質保持のため)



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、
又は下記にお願いいたします。



連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00 (土、日、祝日を除く)

発売元 大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号

<http://www.taisho.co.jp/colac/>

製造販売元 京都薬品工業株式会社
京都市中京区西ノ京月輪町38番地

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 : 0120-149-931(フリーダイヤル)